

Le prothorax, à côtés d'abord légèrement arqués, s'arrondit en avant. Il est flave avec la marge basilaire noire et une étroite bande longitudinale noire, ayant dans son milieu une carène bien saillante et partant de la base pour se prolonger jusqu'au sommet; en outre, une tache oblongue orangée est située de chaque côté de la jonction de cette bande avec la base.

Cette petite espèce, à antennes faiblement dentées, se place dans le voisinage du *L. tricolor* Ern. Oliv. et *dissimilis* Ern. Oliv., dont elle se distingue surtout par la coloration du prothorax et sa taille bien moindre.

République Argentine : Misiones, Villa Lutezia, environs de San Ignacio (Muséum de Paris). Existait déjà dans ma collection avec l'indication générale : Brésil.

NOTE SUR DIVERS COLÉOPTÈRES BUPRESTIDES
DES COLLECTIONS DU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS,

PAR M. CH. KERREMANS.

Bien que la plupart des espèces mentionnées ci-dessous soient anciennement connues, je crois utile d'en donner la liste complète, parce que tous les spécimens qui m'ont été soumis portent l'indication exacte des lieux de capture, toujours intéressante à signaler. Cela permettra, dans l'avenir, de délimiter d'une façon précise l'aire de dispersion de chacune d'elles en contribuant à la fixation de leur répartition géographique.

Les espèces sont de provenances variées, les unes ayant été recueillies par la Mission du Bourg de Bozas dans l'Afrique orientale ciséquatoriale en 1903, les autres par M. G. Vasse au Mozambique en 1907, et les autres enfin au Mexique, par M. L. Diguët, en 1903 et 1904.

L'ensemble est classé par ordre systématique des genres et des espèces.

STERNOCERA CASTANEA OL., var. DRURYI Waterh., *Ann. Mag. Nat. Hist.*, sér. 7, t. XV (1904), p. 247. — Abyssinie, province équatoriale : pays de Diné (du Bourg).

S. BOUCARDI E. Saund., *Cist. Ent.*, I (1874), p. 219; Kerrem., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. XXXII (1888), pl. I, fig. 5. — Djibouti (du Bourg).

S. ORISSA Buq., *Bull. Fr.* (1837), p. 76; Gory, *Monogr. supp.*, t. IV (1840), p. 5, pl. I, fig. 3. — Mozambique : vallée du Pungué (G. Vasse).

S. KLUGI Thoms., var. MEPHISTO Thoms., *Arc. Nat.*, t. I (1859), p. 118. — Dahomey (A. Bonhoure).

JULODIS (*Neojulodis*) SUBVITTATA E. Saund., *Tr. Ent. Soc. Lond.* (1872), p. 239. — Mozambique : vallée du Pungué (G. Vasse).

ACMEODERA CUPRINA Spin., *Ann. Fr.* (1838), p. 367; *hirtula* Gory, *Monogr. supp.*, t. IV (1840), p. 29, pl. V, fig. 27. — Mexique : Oaxaca, région de Sylacayoapam (*L. Digue*t).

A. LATERALIS Chevrol., *Col. Mex.* (1833), n° 6; Cast. Gory, *Monogr.*, t. I (1835), p. 3, pl. I, fig. 3. — Mexique : Puebla, environs de Tehuacan (*L. Digue*t).

A. FLAVOMARGINATA Gray, *Anim. Kingd.*, t. I (1831), p. 358, pl. XXXI, fig. 2. — Mexique : Puebla, environs de Tehuacan (*L. Digue*t).

A. RUBRNOTATA Cast. et Gory, *Monogr.*, t. I (1832), p. 5, pl. I, fig. 5. — Mexique : Puebla, environs de Tehuacan; Jalisco, environs du Guadaluajara (*L. Digue*t).

A. DECIPIENS Lec., *Proc. Acad. Philad.* (1866), p. 383; Horn, *Tr. Am. Ent. Soc.*, t. VII (1878), p. 16, pl. I, fig. 17. — Mexique : Puebla, environs de Tehuacan (*L. Digue*t).

A. PICTA Waterh., *Biol. Centr.-Amer.*, t. III, pt. I (1882), p. 24, pl. II, fig. 6. — Mexique : Puebla, environs de Tehuacan (*L. Digue*t).

A. FÄHREI Kerrem., *Monogr.*, t. III (1909), p. 593. — Mozambique : vallée du Pungué (*G. Vasse*).

A. LUZONICA Nonfr., *Berl. Ent. Zeit.*, t. XL (1895), p. 302. — Îles Philippines : Manille (*Rothschild*).

A. SANGUINEOSIGNATA Cast. et Gory, *Monogr.*, t. I (1836), p. 22, pl. VI, fig. 36. — Moyen-Chari : Niu-Kunu (*J. Decorse*).

A. RUFICAUDIS de Geer, *Mém. Ins.*, t. VII (1778), p. 632, pl. XLVII, fig. 11. — Mozambique : vallée du Pungué (*G. Vasse*).

A. POSTICALIS Cast. et Gory, *Monogr.*, t. I (1836), p. 28, pl. VIII, fig. 47. — Chari et Moyen-Chari (*J. Decorse*); Mozambique : vallée du Pungué (*G. Vasse*).

A. ÆQUALIS Obst, *Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. XLVII (1903), p. 143. — Kerrem., *Monogr.*, t. II, pl. XVI, fig. 5. — Galla Itu : Natchu (*du Bourg*).

A. ELEVATA Klug, *Symb. Phys., Bupr.*, t. I (1829), p. 6, pl. I, fig. 6. — Harar méridional; Abyssinie (*du Bourg*).

A. POLITA Klug, *Symb. Phys., Bupr.*, t. I (1829), p. 7, pl. I, fig. 7. — Bas-Chari : fort Lamy (*J. Decorse*).

STERASPIS AMBIGUA Fähr., *Ins. Cafr.*, t. I (1851), p. 312; Kerrem., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. XXXIX (1895), p. 380, fig. 2. — Var. Mozambique : vallée du Pungué (*G. Vasse*).

EVIDES GAMBIENSIS Cast. et Gory, *Monogr.*, t. I (1835), *Chrysodema*, p. 11, pl. III, fig. 15. — Mozambique : vallée du Pungué (*G. Vasse*).

E. PUBIVENTRIS Cast. et Gory, var. CUPRIVENTRIS Thoms., *Typ. Bupr.* (1878), p. 24. — Mozambique : vallée du Pungué (*G. Vasse*).

E. TRIANGULARIS Thoms., *Typ. Bupr.* (1878), p. 24. — Harar (*du Bourg*).

CHALCOPHORELLA STIGMATICA Schönh., *Syn. Ins., App.* (1817), p. 119; Cast. et Gory, *Monogr.*, t. I (1836), *Buprestis*, p. 18, pl. IV, fig. 17. — Syrie : Saïda (*Durighello*).

PSILOPTERA (*Damarsila*) LIMBALIS Cast. et Gory, *Monogr.*, t. I (1837), p. 78, pl. XX, fig. 104. — Angola : Kihita.

PEROTIS CHLORANA Cast. et Gory, *Monogr.*, t. I (1837), *Aurigena*, p. 3, pl. I, fig. 2. — Syrie : Saïda (*Durighello*).

SPHENOPTERA INSIPIDA Kerrem., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. XLII (1898), p. 296. — Abyssinie (*du Bourg*).

S. CÆCA Kerrem., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. XLII (1898), p. 294. — Galla-Itou : Ouatchou (*du Bourg*).

S. ERYTHREANA Kerrem., *Bull. Soc. Ital. Florence*, t. XXXVIII (1906), p. 92. — Harar : vallée du Herrer (*du Bourg*).

S. NEGLECTA Klug, *Erm. Atl.* (1835), p. 30. — Congo belge : Haut-Uélé (*du Bourg*).

S. DIVERSA Gory, *Monogr. supp.*, t. IV (1841), p. 304, note. — Harar (*du Bourg*).

S. CUPIDA Kerrem., *Monogr.*, t. VI (1913), p. 546. — Abyssinie (*du Bourg*).

POECILONOTA CYANIPES Say, *Journ. Acad. Philad.*, t. III (1823), p. 164. — Orégon : Mont. bleues (*L. Diguët*).

CHALOEPOECILA ORNATA Gory, *Monogr. supp.*, t. IV (1840), p. 93, pl. XVI, fig. 90. — Tucuman : environs de Constitucion (*J. Künckel*).

ANCYLOCHEIRA LAUTA Leconte, *Proceed. Acad. Philad.* (1834), p. 17. — Mexique : Jalisco, environs du Guadalajara (*L. Diguët*).

MELANOPHILA LONGIPES Say, *Journ. Acad. Philad.*, t. III (1823), p. 164. — Orégon : Mont. bleues (*L. Diguët*).

M. UNICOLOR Gory, *Monogr. supp.*, t. IV (1840), p. 73, pl. XIII, fig. 71. — Mozambique : vallée de l'Usungué (*G. Vasse*).

M. CUSPIDATA Klug, *Symb. Phys., Bupr.* (1829), p. 34, pl. III, fig. 8. — Finmark : Kirkeness (*G. Ponchet*).

MERIMNA ATRATA Cast. et Gory, *Monogr. Bupr.*, t. II (1838), *Chrysob.*, p. 58, pl. X, fig. 79. — L'exemplaire porte la mention : Indes Néerlandaises; l'espèce est de l'Australie.

· ANTHAXIA PILIFRONS Kerrem., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. II (1898), p. 299.
— Mozambique : forêt d'Inhangondé (G. Vasse).

A. TRIANGULARIS Gory, *Monogr. supp.*, t. IV (1841), p. 294, pl. XLIX, fig. 288. — Mozambique : vallée du Revué (G. Vasse).

A. ALBOVILLOSA Kerrem., *Rev. Zool. Afric.*, t. II (1913), p. 443. — Mozambique : forêt d'Inhangondé (G. Vasse).

A. COLMANTI Kerrem., *Rev. Zool. Afr.*, t. II (1913), sous presse. — Mozambique : forêt d'Inhangondé (G. Vasse).

A. **Vassei** nov. sp. — Long. 4 millim. 5; larg. 1,5 millim.

ANTH. MARTINI Bris *vicina, sed caput latius, oculi magis prominentes, pronotum ad latera minus arcuatum, elytra minus rugata; tota nigra, minutissime albido-pubescentis.*

Ressemble, pour la coloration et le facies, à l'*Anth. Martini* Bris., du Nord de l'Afrique, mais avec la tête plus large, les yeux sensiblement plus saillants en dehors, les côtés du pronotum plus parallèles et moins arqués, la surface des élytres moins rugueuse.

Tête large, légèrement convexe, sans impressions ni sillons; la surface couverte de points ocellés très superficiels d'où émerge une très courte pubescence blanchâtre. Pronotum plus large que long, à peine plus étroit en avant qu'en arrière, bisinué en avant, tronqué en arrière, faiblement arqué sur les côtés, avec une fossette dans chacun des angles antérieurs, la surface très également et très finement ridée et couverte de points ocellés très superficiels. Écusson triangulaire, assez grand. Elytres entièrement couverts de rugosités simulant de très fines écailles, mais sensiblement plus rugueux que le pronotum; le tiers postérieur légèrement déprimé le long de la suture et sur les côtés, la dépression latérale limitée intérieurement par une côte parallèle au rebord extérieur. Dessous plus brillant que le dessus; extrémité du dernier segment abdominal subacuminée.

Hab. : Mozambique : vallée du Sungué (G. Vasse).

CHRYSOBOTHRIIS CONSANGUINEA Cast. et Gory, *Monogr. Bupr.*, t. II (1837), *Colobog.*, p. 10, pl. II, fig. 8. — Brésil : Rio de Janeiro (*D' Dupuy*).

CH. DENTIPES Germar, *Ins. Spec. Nov.* (1824), p. 38. — Mexique : Oaxaca, Puerto Angel (*L. Diguët*).

CH. OCTOCOLA Lec., *Proc. Acad. Philad.* (1858), p. 67. — Mexique : Oaxaca, Puerto Angel (*L. Diguët*).

CH. MULTIGUTTATA Mann., *Bull. Soc. Nat. Mosc.*, t. VIII (1837), p. 82. — Mexique : Puebla, environs de Tehuacan (*L. Diguët*).

CH. COSTATA Kerrem., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. XXXIX (1895), p. 213.
— Îles Mariannes (*A. Marche*).

CH. DORSATA Fab., *Mant. Ins.*, t. I (1787), p. 179. — Moyen-Chari (*J. Decorse*); Mozambique : vallée du Pungué, Guengéré (*G. Vasse*).

CH. CURTA Kerrem., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. XXXVII (1893), p. 258.
— Mozambique : vallée du Pungué, Guengéré (*G. Vasse*).

BELIONOTA CANALICULATA Fab., *Mant. Ins.*, t. I (1787), p. 181. — Mozambique : vallée du Pungué (*G. Vasse*).

B. FALLACIOSA H. Deyr., *Ann. Soc. Ent. Belg.*, t. VIII (1864), p. 84. — Saïgon (*Boussignon*).

B. PRASINA Thunb., *Nov. Spec. Ins.*, t. V (1789), p. 90. — Tonkin septentrional : monts du Haut-Song-Chaï (*Rabier*).

STIGMODERA JACQUINOTI Boisd., *Voy. Astrol.*, t. II (1835), pl. VII, fig. 2.
— Australie (*Verreaux*).

S. VARIABILIS DONOV., *Epit. Ins. N. Holl.* (1805), pl. VII, fig. 1.^o — Australie (*Verreaux*).

S. OCTOSPILOTA Cast. et Gory, *Monogr. Bupr.*, t. II (1838), p. 28, pl. VI, fig. 19. — Australie (*Stanhorpe*).

S. DECEMMACULATA Kirb., *Trans. Linn. Soc.*, t. XII (1818), p. 456, pl. XXIII, fig. 3. — Australie (*Stanhorpe*).

S. AUSTRALASIE Cast. et Gory, *Monogr. Bupr.*, t. II (1838), p. 32, pl. VII, fig. 35. — Australie (*Stanhorpe*).

S. OCTOMACULATA E. Saund, *Journ. Linn. Soc.*, t. IX (1868), p. 472, pl. X, fig. 27. — Australie (*Stanhorpe*).

S. JOSPILOTA Cast. et Gory, *Monogr. Bupr.*, t. II (1838), p. 35, pl. VII, fig. 39. — Australie (*Verreaux*).

S. FLAVOPICTA Boisd., *Voy. Astrol.*, t. II (1835), p. 92. — Australie (*Stanhorpe*).

S. CRUENTATA Kirb., *Trans. Linn. Soc.*, t. XII (1818), p. 455, pl. XXIII, fig. 1. — Australie (*Stanhorpe*).

S. OCELLIGERA Gory, *Monogr. supp.*, t. IV (1841), p. 133, pl. XXIII, fig. 132. — Australie (*Stanhorpe*).

S. RUFIPENNIS Kirb., *Trans. Linn. Soc.*, t. XII (1818), p. 456. — Australie : Melbourne (*von Mueller*).

S. ERYTHROMELAS Boisd., *Voy. Astrol.*, t. II (1835), p. 75, pl. VI, fig. 7. — Australie (*Stanhorpe*).

MELIBEUS NODOSUS Fährus, *Act. Nov. Ups.* (1827), p. 50. — Mozambique : forêt d'Inhangondé (*G. Vasse*).

M. VIRIDANUS Cast. et Gory., *Monogr. Bupr.*, t. II (1839), *Coræbus*, p. 11, pl. III, fig. 15. — Harar (*du Bourg*).

PSEUDAGRILUS SOPHOROIDES Murray, *Ann. Mag. Nat. Hist.*, 4^e sér., t. II, p. 106. — Galla Itou (*du Bourg*).

STENOGASTER DIFFUSUS Chevrol., *Silb. Rev. Ent.*, t. V (1837), p. 87. — Mexique : Puebla, environs de Tehuacan (*L. Diguët*).

COLLECTIONS RECUEILLIES PAR M. E.-R. WAGNER

DANS LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE.

COLÉOPTÈRES BUPRESTIDES,

PAR M. CH. KERREMANS.

ACHERUSIA CHILDRENI Cast. et Gory, *Monogr. Bupr.*, t. I (1835), p. 2, pl. 1, fig. 2. — Chaco de Santa Fé : bords de la rivière las Garzas, à 20 kilomètres Ouest d'Ocampo.

POLYCESTA EXCAVATA Blanch., *Voy. Orbigny, Ent.* (1846), p. 149. — Kerrem., *Monogr.*, t. I (1905), pl. 10, fig. 5. — Chaco de Anatuya : Tentina; province de Santiago del Estero : environs d'Icaño, Mistol Paso.

TYNDARIS PLANATA Cast. Gory, *Monogr. Bupr.*, t. I (1835), p. 5, pl. 1, fig. 4. — Chaco de Santiago del Estero : la Palisa del Bracho, laguna Maitana, environs d'Icaño.

CHRYSESTHES TRIPUNCTATA Fab., *Mant. Ins.*, t. I (1787), p. 179. — Chaco de Santa Fé : las Garzas, bords du rio Las Garzas, environs d'Ocampo.

PSILOPTERA ATTENUATA Fab., *Ent. Syst.* (1794), p. 187. — Brésil : Minas Geraes, environs de Passa Quatro, bords du rio de las Pedras, 1,000 mètres.

P. PLAGIATA Gory, *Monogr. Supp.*, t. IV (1840), p. 84, pl. 14, fig. 80. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño, la Palisa del Bracho, 25 kilomètres d'Icaño ;

P. CORYNTHIA Fairm., *Ann. Soc. Ent. Fr.* (1864), p. 264. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño.

P. TUCUMANA Guér. et Perch., *Gen. Ins.* (1835), n^o 2, pl. 6. — Province de Santiago del Estero : bords du rio Salado, environs d'Icaño, la Palisa del Bracho, Barrancas.